



Bor til vinterraps

Vinterrapsmarkerne stikker af nul!

De rapsmarker der har overvintret godt strækker sig for alvor nu. Har man ikke nået at vækstregulere inden påske, og har man kraftige planter, en lidt for tæt plantebestand (over 30 pl/m²) og tildeler

man en høj kvælstofmængde tidligt, så kan der vækstreguleres med 1 l Caryx eller 0,7 l Medax Top + AMS pr ha. Kør under ingen omstændigheder, hvis der er udsigt til nattefrost den efterfølgende nat.

Vækstregulering af Raps
1 l Caryx / ha
Eller
0,7 Medax Top + AMS

Bor giver ofte merudbytte i raps på let jord! Især ved høje reaktionstal og tør forsommer. I grelle tilfælde rådner hjerteskuddet, men ofte vil man i raps opleve det som, at bladene bliver rødlig og krøller, OG at antallet af blomster reduceres. Det er her, det koster!

I år med øget udvaskning bør der tildeles 400-500 g Bor pr ha. Eks. "Lebosol" som er let opløseligt og blandbar med andre midler. Det indeholder 150 g Bor pr l og desuden 3,5 % kvælstof, der ligeledes virker som bladgødsning.

Risikomarker bør tildeles 1,5 l Lebosol i påsken og 1,5-2 l igen, når rapsen står med den gule knop ca. 10 dage efter.

Bor i Raps

1. 1,5 ha / l Lebosol - Std. 51
2. 1,5-2 l Lebosol - Std. 59

Husk at borprodukter gør sprøjtevæsken basisk. Det kan give nogle uheldige udfældninger. Der skal derfor altid tilsættes forsuring til vandet inden andet tilsættes eks. 0,2 l Novabalance pr 100 l vand. Derefter evt. vækstregulering/svampemidler og så Borproduktet til sidst.

Status på skadedyr i raps

Få glimmerbøsser. De fleste steder vil rapsen udvikle til sig til blomst, inden glimmerbøsserne kommer over skadetærsklen. Skadetærsklen er lige nu 3-4 biller pr plante. I de senere knopstadier er skadetærsklen 10 pr plante.

Både landmænd, kemifirmaer og konsulenter rundt i landet holder øje med det i Danmark nye skadedyr "Bladribbe-snudebiller". Den er tidligt på vingerne og er set i lavt antal mange steder allerede. 10-14 dage efter indflyvningen lægger hunnen æggene. Jo varmere det er under æglægning, jo flere æg lægger hun. Skadetærsklen fastsættes pt. som 15 snudebiller i gul fangbakke på en uge. Sidste år nåede den lokalt at blive komme over skadetærsklen et par steder, og vi har kendskab til flere, der udførte behandling imod dem. Der behandles med godkendt pyrethroid.



Manganmangel

Der er stadig en del manganmangel i vintersæden. Det allervigtigste er, at der er tildelt sur gødning, så virkningen kommer nede fra. Derefter udsprøjtes mangan i problemområder med 1 l pr ha. Det er vigtigere at køre en gang om ugen med en lille mængde, end det er at køre flere kg/l ud på én gang, da planterne ikke kan optage ret store mængder ad gangen.

Manganmangel vintersæd

1. Tildel sur gødning
2. 1 l Mangan 235
3. 1 l Mangan 235, ugen efter

Vækstregulering tidligt sået rug og hvede

Det der er mest afgørende for behovet for vækstregulering er såtidspunktet! I tidligt sået vintersæd er risikoen for lejesæd meget større. Uanfægtet sort og kvælstofstrategi.

Tidligt sået vintersæd er flere steder nu i std. 30-31. Det er derfor ligeledes kort efter påske at vækstregulering med CCC-midler skal iværksættes, for at holde det første knæ så langt nede som muligt. Jo kortere de første internodier er -jo stærkere bliver strået nede fra. Hvis temperaturerne

Vækstregulering tidligt sået rug og hvede

Det der er mest afgørende for behovet for vækstregulering er såtidspunktet! I tidligt sået vintersæd er risikoen for lejesæd meget større. Uanfægtet sort og kvælstofstrategi.

Tidligt sået vintersæd er flere steder nu i std. 30-31. Det er derfor ligeledes kort efter påske at vækstregulering med CCC-midler skal iværksættes, for at holde det første knæ så langt nede som muligt. Jo kortere de første internodier er -jo stærkere bliver strået nede fra. Hvis temperaturerne

Væksregulering tidl. Sået rug/hvede
0,5 l Stabilan Extra + 0,25 Moddus M

lige knapt er så høje som optimalt for CCC, så kan der med fordel blandes med et Moddus-produkt for at sikre effekten.

Der er gode erfaringer med at blande 0,5 l Stabilan Extra (CCC) og Broadway, når denne køres i starten af april. Broadway er i sig selv vækstregulerende, så det vil øge den samlede virkning. Er der sået til normal tid medio september, så kan denne behandling ofte gøre det ud for vækstreguleringen.

Følg vores faglige indlæg på facebook, hvor vi i løbet af sæsonen kommer ind på flere spændende emner i marken - [klik her](#).

Vil du gerne høre mere? Kontakt os på 3841 6600.



BAT Agrar DK ApS · Vævervej 16 · 7490 Aulum · Telefon +45 38416600
SE/CVR: 26851300 · Forretningsfører: Martin Lauridsen, Jan Thorsen

Dette nyhedsbrev kan ikke besvares. Du får nyhedsbreve fra os fordi du er kunde hos os eller fordi du har filmeldt dig vores nyhedsbreve. Hvis du ikke længere ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra os kan du klikke på linket forneden. Læs mere om vores [privatlivspolitik](#).