



OBS ved tidlig såning

Den første vintersæd blev sået i det fine vejr i sidste uge. Mange steder har folk i år gjort det pga. efterafgrødereglene, men der er selvfølgelig også gode argumenter så som kapacitet og buskning på kold jord. Vær dog ekstremt opmærksom på, at tidligt sået vintersæd er et koncept og skal behandles særskilt herefter. Man kan ikke bare så tidligt og gøre, som man altid gør. Især i hvede kræver det en særskilt strategi.

De største risikofaktorer i tidligt sået vinterhvede

1. Havrerødsort

Spredes med lus, ofte skal der flere behandlinger til i efteråret.

2. Goldfodssyge

Den usynlige dræber, som giver dårlige rødder med næmmodne aks til følge. Hvede og byg opformerer goldfodssyge. Vekselafrøder og havre reducerer smitten. Sår man tidligt efter hvede eller byg, så bør man vælge udsæd bejdset med Latitude. Så betyder det mindre, hvilken sort man har.

3. Græsukrudt

Ukrudt og i særdeleshed græsukrudt bliver meget mere vanskeligt at styre, når man sår tidligt. De fleste græsser er aller mest villige til at spire i første halvdel af september. Når såningen udsættes spirer færre frem, og vores efterårskemi virker væsentligt bedre, når det er mere køligt og fugtigt. Er der i marken i forvejen problemer med væselhale, italiensk rajgræs eller ager-rævehale, så bør der aldrig sås tidlig vintersæd.

Det er en udfordring at anvende Boxer i starten af september. Det giver både for dårlig virkning og for høj risiko for afsætning på uønskede afgrøder. Derfor lægges der en bund med DFF-produkt ved tidlig såning. Der kan i hvede også anvendes Mateno Duo. Især på lettere jord med de typiske sandjords-ukrudtsarter har Mateno sin berettigelse. Man ved at Mateno Duo og Boxer virker godt sammen. Det er dog kun muligt at blande dem i hvede.

Forslag til sprøjteplan ved tidligt sået hvede

1. 0,15 l Sempra pr ha. -Tre dage efter såning
2. 1 l Boxer + 0,25 l Mateno Duo + 0,15 kg Lamdex pr ha. -Ca 20. sep, hvis temperaturene er ok til Boxer.
3. 0,5 l Atlantis + 0,1 l Mavrik pr ha. -Første uge i oktober, Atlantis kan udelades, hvis marken er ren for ukrudt.

Behandlinger i tidligt sået rug

1. 0,15 l Sempra pr ha. -Tre dage efter såning
2. 0,35 l Mateno Duo + 0,15 kg Lamdex pr ha. (Når rugen skifter til grøn farve) ca 20. Sep.
3. 0,45 l Atlantis + 0,1 l Mavrik (Atlantis udelades ved forholdsvis rene marker)

Behandlinger i tidligt vinterbyg

1. 0,15 Sempra pr ha -Tre dage efter såning
2. 1,5 l Boxer + 0,15 kg Lamdex
3. 7 g Express 50 SX + 0,15 spr/kl + 0,1 l Mavrik

Manganmangel i vintersæd

Forebyg manganmangel de steder hvor der er tilbagevendende problemer, helst ved at placere eller tildele svovlsur ammoniak.

Når man først er bagefter med mangan, så er det vanskeligt at "helbrede" planterne igen. Er der derfor tale om lettere jord, så giver det god mening at sprøjte mangan ud inden symptomerne er synlige med øjet. BAT forhandler et flydende manganprodukt fra Lebosol, "Mangan-Nitrat 235", som er letopløseligt, hurtigt optaget og attraktivt prismæssigt. Det indeholder, ud over de 235 g mangan, også 120 g Nitrat-N pr l, som giver en kvælstofvirkning i gennem bladet. Desuden sikrer den flydende formulering nem og sikker håndtering.





Følg vores faglige indlæg på facebook, hvor vi i løbet af sæsonen kommer ind på flere spændende emner i marken - [klik her](#).

Vil du gerne høre mere? Kontakt os på 3841 6600.



BAT Agrar DK ApS · Vævervej 16 · 7490 Aulum · Telefon +45 38416600
SE/CVR: 26851300 · Forretningsfører: Martin Lauridsen, Jan Thordsen

Dette nyhedsbrev kan ikke besvares. Du får nyhedsbreve fra os fordi du er kunde hos os eller fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve. Hvis du ikke længere ønsker at få tilsendt nyhedsbreve fra os kan du klikke på linket forneden. Læs mere om vores [privatlivspolitik](#).